



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

## Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4  
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

### Przygotowanie pacjenta do badania CT

Obowiązkowo, najpóźniej w dniu badania należy dostarczyć wyniki badań wykonanych wcześniej (CT, MR, RTG, USG) dotyczących tego samego rozpoznania.

**Badanie bez podania środka kontrastowego** (HRCT płuc, HRCT piramid kości skroniowych, CT zatok, CT układu kostno-stawowego) nie wymagają specjalnego przygotowania.

#### **Badania z podaniem dożylnym środka kontrastowego:**

##### *CT głowy, CT szyi, CT klatki piersiowej, angio CT:*

1. Na 3-7 dni przed badaniem wykonać badanie krwi z oznaczeniem stężenia kreatyniny i eGFR oraz TSH (w przypadku chorób tarczycy).
2. Na 48 godzin przed zaplanowanym badaniem i 24 godziny po wykonanym badaniu, należy odstawić leki przeciwcukrzycowe takie jak: GLUCOPHAGE; METFORMAX; SIOFOR; METRAT; METIFOR; FORMETIC; METFORGAMMA; ETFORM; AVAMINA.
3. W dniu badania pacjent zgłasza się na czczo, ostatni stały posiłek może być przyjęty na 6 godzin przed badaniem. Dozwolone jest picie umiarkowanej ilości płynów.

##### *CT jamy brzusznej i miednicy:*

1. Na 48 godzin przed zaplanowanym badaniem i 24 godziny po wykonanym badaniu, należy odstawić leki przeciwcukrzycowe takie jak: GLUCOPHAGE; METFORMAX; SIOFOR; METRAT; METIFOR; FORMETIC; METFORGAMMA; ETFORM; AVAMINA.
2. W przeddzień badania dieta lekkostrawna, płynna i półpłynna z większą niż na co dzień ilością płynu (min. 2 litry). O godzinie 11-12 należy zażyć preparat przeczyszczający FORTRANS. Każdą z czterech saszetek preparatu należy rozpuścić w 1 litrze wody (łącznie 4 litry płynu) i wypić w tempie 1 litr na godzinę.
3. W dniu badania pacjent zgłasza się na czczo. Dozwolone jest przyjmowanie leków innych niż wymienione w pkt. 1. Na 1,5 godziny przed badaniem należy wypić 1,5 litra wody niegazowanej.

##### *W wybranych przypadkach na zlecenie lekarza radiologa należy wypić:*

- na 3,5 godziny przed badaniem 0,5 litra wody z z rozpuszczonymi w niej 14 ml Ultravist 370;
- na 1,5 godziny przed badaniem 0,25 litra wody z rozpuszczonymi w niej 7 ml Ultravist 370;
- tuż przed badaniem 250 ml wody z rozpuszczonymi w niej 7 ml Ultravist 370;

Po badaniach z dożylnym podaniem środka kontrastowego pacjent pozostaje w Pracowni Tomografii Komputerowej przez 20-40 minut w celu obserwacji.

W ciągu dnia, po badaniu wskazane jest przyjmowanie większej niż na co dzień ilości płynu.

Brak wymaganej dokumentacji lub przygotowania do badania spowoduje wyznaczenie nowego terminu badania zgodnie z obowiązującą kolejką.

Odbiór wyników badania CT w rejestracji RTG (Pracownia Diagnostyki Obrazowej), tel. 15 843 32 28.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 1.46 lub pod numerem telefonu: 15 843 33 34.